

OCORRÊNCIA DO FUNGO *Hirsutella* sp. EM ADULTO DA BROCA DOS
EUCALIPTOS *Phoracantha semipunctata* (FABRICIUS)
(COLEOPTERA, CERAMBYCIDAE)

Evoneo Berti Filho¹
Sérgio Batista Alves¹
João Angelo Cerignoni¹

Phoracantha semipunctata (F.), vulgarmente conhecida como broca dos eucaliptos ou broca *Phoracantha*, é um cerambycídeo exótico, oriundo da Austrália, que atualmente ocorre em quase todas as regiões do globo onde se cultiva eucalipto. Ao contrário de outras pragas introduzidas, como a vespa-da-madeira, *Sirex noctilio* F. (Hymenoptera, Siricidae) e o gorgulho dos eucaliptos, *Gonipterus* spp. (Coleoptera, Curculionidae), que entraram no Brasil com seus parasitos específicos, respectivamente *Ibalia leucospoides* (Höchenwarth) (Hymenoptera, Ibalidae) e *Anaphes nitens* (Girault) (Hymenoptera, Mymaridae), ainda não foram registrados parasitos e/ou predadores específicos de *P. semipunctata* no País, apenas o fungo entomopatogênico *Beauveria brongniartii* (Sacc.) Petch (**Revista de Agricultura**, 70 (3): 346). Em material de laboratório, recentemente coletado no campo, foi verificada a ocorrência do fungo *Hirsutella* sp. em um adulto de *P. semipunctata*. Este é o segundo registro de um inimigo natural da broca dos eucaliptos, *P. semipunctata*, no Brasil.

¹ Dep. de Entomologia, ESALQ/USP. Caixa Postal 9.
13418-900 Piracicaba-SP, Brasil.