

çadas, distantes umas das outras de vinte centímetros, mais ou menos. A sementeira a lanço, mais fácil, acarretaria muito maiores trabalhos durante as capinas.

Cereais de inverno — As variedades de trigo precoces (4 meses de ciclo vegetativo completo), podem ainda ser semeadas durante todo este mês; se semeadas depois, sua vegetação fica muito na dependência das secas, que entre nós se verificam de junho ou julho em diante. Um dos cereais de inverno, de cuja cultura somos entusiastas, é o centeio, quer cultivado para produzir grão, quer para produzir forragem verde ou fenada, como já foi descrito ao tratarmos dele no mês de março. Pode ser semeado durante o mês de abril, se não nos esquecermos de um detalhe: em qualquer dos casos, deve ser cultivado em terras frescas (o que quer dizer úmidas, contendo excesso de água) onde a umidade não falte nos meses de maio e junho, mesmo na ausência de chuvas.

NOTÍCIAS E ANÁLISES BIBLIOGRÁFICAS

Arquivos do Museu Nacional — Vol. XXXVII — Imprensa Nacional — Rio de Janeiro — 1943.

Leone Atilio Muraño — **Recomendações aos citricultores** — Colheita, transporte, beneficiamento e embalagem das laranjas. — Boletim n. 105 — Secretaria da Agricultura — Porto Alegre — 1943.

Walter A. Bertullo — **Amilasas microbianas** — Apartado de la Revista de la Asociacion de Ingenieros Agronomos — N. 2 — 1943 — Montevideo.

F. Menéndez Lees e R. F. Guerreros — **Alcohol absoluto** — Apartado de la Revista de la Asociacion de Ingenieros Agronomos — N. 4 — 1943 — Montevideo.