

REVISTA DE AGRICULTURA

Diretor responsável: Prof. Salvador de Toledo Piza Junior

DIRETORES:

Prof. Octavio Domingues

Prof. Philippe Westin C. de

Prof. F. Pimentel Gomes

Vasconcellos

Secretário: Dr. Lulz Gonzaga E. Lordello

VOL. XLVI

MARÇO - 1971

N. 1

COPIPHORIDEO NOVO (ORTHOPTERA)

S. DE TOLEDO PIZA JR.

Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"

Universidade de São Paulo — Piracicaba

Homorocoryphus ferreirai sp. n.

♂ — Obscure tomentosus, fronte refescenti. Fastigium crassum, vix longius quam latius, apice rotundatum, subtus fascia nigra ornatum. Pronotum densissime puncturatum, disco marginem posteriorem versus modice ampliato, lobis lateralibus rotundatum insertis, longioribus quam altioribus, inferne obtuse rotundato-angulatis postice rotundatis. Elytra angusta, apice rotundata, indistincte obscure punctata. Mesosternum piceum et metasternum. Femora omnia subtus nigra, I spinis 2, II spinis 3 extus armata, III utrinque spinis complurimis, basi albis, apice castaneis, in punctis nigris implantatis.

Longitudo corporis	30 mm
Longitudo pronoti	9
Longitudo fastigii	1,8
Longitudo elytrorum	40
Latitudo elytrorum	5
Longitudo femorum post.	25

Pátria: Campo Grande (Mato Grosso), num Quartel.

Col. Dr. Hamilton Ferreira, de Rio Claro, 1969, a quem é dedicada a espécie.

Tipo: um macho, na col. do A.

Aproxima-se de *H. finitimus* Karny, do qual se distingue pelo pronoto de lados arredondados e pelos espinhos inferiores dos fêmures posteriores, brancos na porção basilar e castanhos no ápice.