

# REVISTA DE AGRICULTURA

Diretor responsável: Prof. Salvador de Toledo Piza Junior

## DIRETORES:

Prof. Octavio Domingues

Prof. Philippe Westin C. de

Prof. F. Pimentel Gomes

Vasconcellos

Secretário: Dr. Luiz Gonzaga E. Lordello

VOL. XLVIII

MARÇO - 1973

Nº. 1

## MAIS UM COIPHORIDEO (Orthoptera)

S. DE TOLEDO PIZA JR.

Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"

Universidade de S. Paulo — Piracicaba

### *Homorocoryphus vittatus* s. n.

Gracilis, viride-tomentosus, partim castaneo-vario ornatus. Caput et pronotum puncturata, castaneo et luteo alternatim vittata, lineae lutea in medio ornata. Fastigium verticis breve, subaeque longum ac latum, apice rotudato nonnihil ampliata, substus fascia transversa diluta ornatum. Pronotum antice posticeque modice rotundotum, lobis deflexis rotundatim insertis, vix longioribus quam latioribus. Elytra angusta, parallela, apice rotudata, femora postica valde superantia, sparsim fusco-punctata, venis radialibus castaneis, area costali albescenti, margine antico castaneo-nigro. Lobi mesosternales triangulares, apice minute nodulosi. Femora I et II subtus inermia, extus ad marginem inferiorem castaneo-nigra.

Femora postica parte ampliata extus castaneo nigro bi-vittata, parte angusta intus tantum spininulis nonnullis armata (3-4). Segmentum anale postice proeminenter angulatum, in medio profunde sulcatum. Ovipositor rectus, acutus, extremitatem femorum posteriorum valde superans, sed apice elytrorum haud attingens.

Longitudo corporis . . . . .	25,0 mm
Longitudo pronoti . . . . .	6,0
Longitudo elytrorum . . . . .	37,0
Latitudo elytrorum . . . . .	4,0
Longitudo fem. post. . . . .	19,0
Longitudo ovipositoris . . . . .	20,0

Pátria: Santa Rita do Passa Quatro (S.P.), coletado em dezembro de 1969.

Col.: Dr. Amilton Ferreira.

Tipo: Uma fêmea, no Departamento de Zoologia da ESALQ.

Difere de *Homorocoryphus occidentalis* (Saussure) pelo fastígio do vértice inferiormente provido de uma faixa transversal muito diluída (inteiramente negro, em *occidentalis*), pelos élitros muito mais breves (46 mm, em *occidentalis*) e pelos fêmures posteriores também mais curtos (25 mm, em *occidentalis*).

