

UMA NOVA ESPÉCIE DE BARATA DE PIRACICABA
(Blattidae - Blaberinae)

S. DE TOLEDO PIZA JR.

Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"
Universidade de S. Paulo — Piracicaba

BLABERUS NIGROTECTUS sp. n.

Mas — Badius. Caput nigro-nitidum, minutissime puncturatum, clypeo, oculis, ocellisque luteis, distantia interoculari articulo primo antennarum majore, a pronoto vix obtectum. Pronotum transverse ellipticum, nitidum, punctis parvulissimis praeditum, partim lineatum, macula nigra permagna marginem posticum attingente, antice quam postice angustiore, area lutea quadrangulari longiore quam latiore in medio, altera rotundata, parva, utrinque, ornatum. Elytra lata, extremitatem abdominis valde superantia, apice rotundata, badia, vitta humerali nigro-nitida ornata. Pedes castaneo-nitidi. Femora antica inferne spinis 2 antice prope basin, altera postice prope apicem necnon spina apicali utrinque armata. Femora intermedia praeter spinas apicales spina postica praeapicali. Femora postica inferne spina apicali anteriore tantum instructa. Segmenta abdominalia ventralia castanea, lateraliter nigricantia. Lamina subgenitalis asymetrica, latero dextero vix emarginato. Styli tenuissimi.

Femina — Mari similis sed robustior, oculis obscurioribus, areis luteis maculae pronoti nigrae indistinctis, vix notatis.

	Mas	Femina
Longitudo corporis	33,0mm	38,0mm
Longitudo pronoti	9,8	11,0
Latitudo pronoti	13,5	15,3
Longitudo elytri sinistri	38,5	44,0
Latitudo elytri sinistri	13,0	16,0
Longitudo femorum anticorum	6,0	7,5
Longitudo femorum posticorum	8,0	10,5
Longitudo tibiaram posticarum	9,5	11,0

Pátria : Piracicaba, S. Paulo.

Col. : Lásara Zandoval, um macho, em XI-1958; O. Paula Machado, uma fêmea, em II-1937.

Tipos : Um macho e uma fêmea, no laboratório do autor.