

## DUAS NOVAS ESPÉCIES DE *Gryllacris* DO BRASIL (*Orthoptera*, *Gryllacridae*)

S. DE TOLEDO PIZA JR.

Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"  
Universidade de S. Paulo — Piracicaba

### *Gryllacris piracicabae* s. n.

Femina — Cinerescens. Vertex convexus, nitidus, fastigio lato, articulo primo antennarum sexqui latiore, cum fronte atro, maculis ocelliformibus magnis, ocraceis tribus. Pronotum nitidum marginibus castaneis. Elytra hyalina, venis venulisque castaneis. Alae hyalinae, venis dilutioribus, venulis albis. Femora postica parte apicali castaneo-diluta, inferne spinis nigro-nitidis 5-6 armata, area nigra, praeapicali ornata. Tibiae posticae castaneae, superne spinis 6, apice nigris, utrinque praeditae. Ovipositor gracilis, vix incurvus, apice acuto. Lamina subgenitalis margine postico rotundata.

Longitudo corporis .. .. .	21,0 mm
Longitudo pronoti ... ..	4,8
Longitudo elytrorum . . . . .	24,0
Latitudo elytrorum ... ..	7,0
.. Longitudo fem. post. ....	12,2
Longitudo ovipositoris ....	15,6

Pátria: Piracicaba, São Paulo.

Col.: A. Zamith e A. Correia, II-1945.

Tipo: Uma fêmea, no Departamento de Zoologia da ESALQ.

Aproxima-se de *G. laevigata* Brunner, conhecida só do macho.

*Gryllacris viçosae* s. n.

Mas. — Statura modica, colore badia. Vertex convexus, nitidus, fastigio articulo primo antennarum sexqui latiore, obscuriore, maculis ocelli formibus parvis, luteis. Pronotum castaneo sordidum. Elytra hyalina, extremitatem versus sensim ampliata, dimidio apicali ferrugineo conspersa. Alae hyalinae. Femora castaneo sordida, III subtus spinis parvis 4-5 extus, 3-4 intus armata. Tibiae posticae basi obscuriores, superne spinis acutis, apice castaneis, 6-6 armatae. Segmenta abdominalia dorsalia castaneo cincta. Lamina subgenitalis profunde emarginata. Ovipositor subrectus, fortis, apice acuto. Cerci teretes, acuminati, introrsum incurvi.

Longitudo corporis .. .. .	17,0 mm
Longitudo pronoti .... .	3,5
Longitudo elytrorum . . . . .	20,0
Latitudo elytrorum .. . . .	7,0
Longitudo fem. post. .... .	9,0
Longitudo ovipositoris .. . . .	13,2

Pátria: Viçosa, E. de Minas Gerais.

Col.: Venetti.

Tipo: Um macho no Departamento de Zoologia da ESALQ.