

## OCORRÊNCIA DO NEMATÓIDE *Heterodera fici* NO RIO GRANDE DO SUL

Antonio Marco Brancalion <sup>(1)</sup>

José Inácio Zanon <sup>(1)</sup>

Antonio Carlos Zem <sup>(1)</sup>

Em nosso País, o nematóide «dos cistos da figueira» (*Heterodera fici* Kirjanova, 1954) foi assinalado pela primeira vez por MONTEIRO et al. (1977) em raízes de sua planta hospedeira típica (*Ficus carica* L.), cultivada no município de Valinhos, Estado de São Paulo.

Tendo em vista a importância do parasito em causa, há interesse em se informar que o mesmo foi verificado recentemente no Município de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, associado a figueiras em plantio comercial, tendo as mudas sido introduzidas de Valinhos, SP, região onde o parasito foi encontrado pela primeira vez. As plantas infestadas se apresentavam em franca decadência (com tamanho reduzido, secamento de ponteiros e clorose) e improdutivas, tendo muitas sucumbido. As infestações de *H. fici* estavam associadas a *Meloidogyne incognita* (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949).

### SUMMARY

*Heterodera fici* is recorded as a parasite of roots of fig trees in the State of Rio Grande do Sul, Brazil.

### LITERATURA CITADA

- MONTEIRO, A.R., L.G.E. LORDELLO & R.R.A. LORDELLO, 1977. Ocorrência no Estado de São Paulo do nematóide *Heterodera fici* Kirjanova, 1954, nocivo à figueira. **Soc. Bras. Nemat. Publ. n.º 2**: 102-108.

<sup>(1)</sup> FMC do Brasil S.A., CEP 13.100, Campinas, SP.