

UMA NOVA ESPÉCIE DE ARANHA DO GÊNERO *ERIOPHORA* (ARGIOPIDAE-ARANEINAE)

S. DE TOLEDO PIZA JR.
Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", Universidade de São Paulo, Piracicaba

Eriophora virgata sp. n.

Cephalothorax colore castaneo-nigra, in medio sublaevis, pilis spiniformibus in granulis obsoletis implantatis, lateraliter hirsutus, pilis flavis, area oculorum rufescenti. Oculi medii tumulum latum, humilem, occupantes, anteriores posterioribus vix majores et inter se remotiores. Sternum castaneo-nigrum, antice valde latius, pilis flavis. Labium ad marginem cum basi maxillarum luteum. Pedes crassi, castaneo-nigri, hirsuti ac spinosi, articulationibus fere omnibus luteis.

Abdomen globosum, colore luteo-sordida, superne in medio foveis obscuris in quadrangulo dispositis, posterioribus majoribus et inter se remotioribus, virgis complurimis parce expressis, nonnullis confluentibus, verticaliter circumdatum, pilis spiniformibus obtectum, inferne nigricanti, area epigyni lutescenti. Scapus epigyni basi latissimus, abrupte attenuatus, sat gracilis, subrectus, ventraliter transversim leviter sulcatus, apice acuto, prope mamillas terminatus. Anulus campi mamillarum articulationesque lutei.

Longitudo corporis	22 mm
Cephalothorax	7 × 8 mm
Longitudo pedum	30-27-15-25 mm
Abdomen	17 × 16 mm

Pátria: São João da Boa Vista (S.P.).

Col.: Sérgio Batista Alves, IV-1976.

Tipo: Uma fêmea, no Departamento de Zoologia da ESALQ, Piracicaba.

A presente espécie aproxima-se de *Eriophora minax* (O. P. Cambr.), da qual se distingue pelo tamanho e forma, pela cor uniforme do abdo-

me, pelo escapo epiginal diretamente dirigido para trás (dobrado, em *minax*) e destituído de sulco longitudinal.



Eriophora virgata sp. n.