

NOVA OCORRÊNCIA DO NEMATÓIDE *Meloidogyne hapla* EM CAFEIEIRO

Luiz Gonzaga E. Lordello (1)

LORDELLO & MONTEIRO (1974) informaram a ocorrência de *M. hapla* Chitwood, 1949, em dois cafezais do município de S. Manuel, no Estado de S. Paulo. Desde então, não foram publicados outros registros da espécie em cafeeiro no Brasil.

À vista da escassez de informações, pareceu-nos de interesse relatar o encontro do mesmo nematóide em uma propriedade (Fazenda São Jorge) do município de Piratininga, SP. Tratava-se de um cafezal de 12 anos, em vias de ser erradicado, tais eram as condições precárias em que se encontrava.

O estado decadente da plantação, porém, aparentemente resultava primariamente da ação da espécie *M. incognita* (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949, que posteriormente também fôra ali identificada.

SUMMARY

Meloidogyne hapla is once more referred to as a parasite of coffee trees in the State of S. Paulo, Brasil. Its distribution in the state now comprises two counties namely S. Manuel, where it was originally found on coffee, and Piratininga (new area).

LITERATURA CITADA

LORDELLO, L.G.E. & A.R. MONTEIRO, 1974. Informação preliminar sobre um nematóide nocivo ao cafeeiro, **Soc. Bras. Nemat. Pub. n.º 1**: 13-15.

(1) Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", USP, Piracicaba